

Intoxication au raticide: détecter les signes pour sauver votre animal - L auxiliaire vétérinaire informe les clients

Source : communiqué de Presse TVM - Mars 2015

Publié par:

Publiée le : : .



Apprendre à détecter les signes d'une intoxication au raticide peut vous permettre de sauver la vie de votre animal !

Première cause d'intoxication chez les chiens et deuxième chez les chats, l'ingestion accidentelle de produits raticides se chiffre à environ 1800 cas par an. Il existe un antidote spécifique à ce type d'empoisonnement, la Vitamine K1, qui peut être administrée par un vétérinaire. Encore faut-il détecter que votre animal est en danger. En effet, pour être efficace, le traitement d'urgence doit être mis en place dans les heures qui l'ingestion. Apprenez à détecter les signes d'une intoxication au raticide pour agir rapidement et sauver la vie de votre animal.

[Comment détecter une intoxication aux raticides chez son animal ?](#)

A moins d'avoir été présent au moment de l'empoisonnement de l'animal, il est difficile pour le propriétaire de détecter ce genre d'intoxication a posteriori. En effet, les signes révélateurs d'un empoisonnement aux raticides n'apparaissent qu'entre 2 et 12 jours après l'ingestion. Toutefois, quelques premiers symptômes « classiques » devront alerter le propriétaire assez rapidement : baisse d'appétit, faiblesse générale...

[Quels sont les effets des raticides sur les animaux et quel est le traitement adéquat ?](#)

Les produits raticides type « mort-au-rats » ont des propriétés anticoagulantes qui, une fois le produit ingéré, vont provoquer plus ou moins rapidement des hémorragies internes ou externes chez l'animal et par voie de conséquence une anémie (muqueuses pâles). Si vous avez été témoin de l'ingestion de raticides par votre animal, vous pouvez l'emmener chez le vétérinaire dans un délai de 6 heures afin que ce dernier fasse vomir l'animal pour éliminer le poison. Si l'empoisonnement n'a pas été deviné et que les hémorragies provoquées sont détectées trop tard (plusieurs jours après), l'issue peut être fatale.

Pour éviter cela, le vétérinaire administrera en urgence à l'animal et en fonction de son état clinique, un traitement à la Vitamine K1 (antidote spécifique des raticides) qu'il conviendra de suivre scrupuleusement afin d'éviter toute rechute. Rappelez-vous surtout que le suivi strict et intégral de ce traitement est la clé de sa réussite et de la guérison de l'animal.

Pour compléter votre information, téléchargez notre dépliant consacré au sujet :
<http://www.auxivet.com/images/ASV-15/...aticide-anticoagulant.pdf>