

## Prévention de la Leishmaniose Canine (nouveau) - Actualités produits, médicaments, aliments, labo ....

Publié par:

Publiée le : : .



Prévention de la Leishmaniose canine : un nouveau vaccin européen  
([Je me connecte pour lire l'article](#))

Rappel concernant la Leishmaniose : maladie due à l'infection par *Leishmania infantum* (protozoaire) transmise par un moustique femelle du nom de phlébotome.

Pour en savoir plus sur la maladie, consultez notre article dédié à la [Leishmaniose canine ICI](#)

LetiFrend® : nouveau vaccin européen, commercialisé par le laboratoire MSD Santé Animale en partenariat avec le laboratoire espagnol Leti.

Période à risque : mars à novembre

### Indication du vaccin

Pour l'immunisation active des chiens non infectés âgés de plus de 6 mois afin de réduire le risque de développer une infection active et/ou une maladie clinique après exposition à *Leishmania infantum*.

L'efficacité du vaccin a été démontrée au cours d'une étude sur le terrain dans laquelle les chiens étaient naturellement exposés à *Leishmania infantum* dans des zones à haut risque d'infection sur une durée de deux ans.

Lors d'études en laboratoire comprenant une exposition expérimentale à *Leishmania infantum*, le vaccin a diminué la sévérité de la maladie, notamment les signes cliniques et la charge parasitaire dans la rate et les ganglions lymphatiques.

Début de l'immunité : 4 semaines après vaccination.

Durée de l'immunité : 1 an après vaccination.

### Primo-vaccination

Une dose unique de vaccin (0,5 ml) à administrer aux chiens âgés de plus de 6 mois.

### Rappel

Une dose unique de vaccin (0,5 ml) à administrer une fois par an.

### Questions fréquentes

1 - Y 'a t-il une date limite pour faire vacciner mon chien ?

Réponse : Non, mais il faut tenir compte du délai de la mise en place de l'immunité qui est de 28 jours

2 - Faut-il tester le chien avant de pratiquer la vaccination ?

Réponse : cela est conseillé en effet, car la vaccination sera inefficace si l'animal est infecté.

3 - En plus de la vaccination, faut-il prendre d'autres précautions en zone infectée ?

Réponse : oui c'est préférable : éviter de sortir le chien en extérieur le soir, utiliser des insecticides dédiés domestiques par exemple. (cf notre article sur la Leishmaniose)