

[Nourrir les passereaux juveniles - les granivores](#)

CatÃ©gorie : [Faune sauvage](#)

PubliÃ© par Auxivet le 18-Jun-2012 10:48

Les granivores sont : moineau, verdier, pinson, bouvreuil, chardonneret, tarin ...
Ils sont reconnaissables ? leur bec gros et court, conique pour Ã©craser les graines.

Oisillons sans plumes et dÃ©but d'emplumement

Faire une bouillie Ã©paisse avec du Nutribird ou du Kaytee (disponible chez les vÃ©tÃ©rinaires).

Le mode de prÃ©paration est indiquÃ© sur la boÃ®te (prÃ©parer au fur et Ã mesure).

Prendre la bouillie avec une petite spatule plastique (modÃ¨le agitateur jetable pour cafÃ©).

Attention : la bouillie est Ã servir tiÃ¨de.

On donne toujours du Nutribird ou du Kaytee.

Mettre Ã leur disposition de petites graines (pour canaris ou exotiques) ramollies dans une mangeoire a part. Ne pas laisser les graines non mangÃ©es plus d'une journÃ©e.

Apr?s chaque repas donner quelques gouttes tempÃ©rÃ©es a l'aide d'une seringue ou d'une pipette.

Des que les oiseaux ont pris l'habitude de manger des graines ramollies, passer aux graines sÃ©ches en diminuant les doses de Nutribird.

GÃ©nÃ©ralitÃ©

Lorsque les oisillons commencent Ã voler, ne surtout pas les mettre en cage pour Ã©viter qu'ils ne se cassent les plumes.

Lorsque l'oisillon ne veut pas ouvrir son bec lui glisser doucement l'ongle dans le coin du bec et l'ouvrir avec dÃ©licatesse.

Mettre les oisillons dans des endroits calmes, Ã©viter les visites intempestives.

En ce qui concerne la frÃ©quence des nourrissages, se rÃ©fÃ©rer a la fiche des soins aux passereaux juvÃ©niles du Dr CAVIGNAUX .

Merci beaucoup Ã Elizabeth ZIVCIC (ASV en clinique spÃ©cialisÃ©e faune sauvage).